

¿Cómo Protegen las Inyecciones de DPT a Mi Niño?

Para mantener a su bebé saludable asegure que se le den las vacunas a tiempo. Si a su bebé no lo vacunan, estará en riesgo de enfermarse y desarrollar difteria, tétano o tos ferina. Cuando usted lleve a su bebé a su chequeo regular, lleve su registro de vacunas con usted para que su enfermera especialista o doctor puedan anotar estas vacunas.

¿Qué enfermedades puede prevenir esta inmunización?

- **La difteria** es una enfermedad muy seria. Se reconoce por una garganta muy dolorosa y puede incapacitar la respiración de una persona, causando parálisis (cuando una persona no puede mover algunos músculos), o causa una deficiencia cardíaca. Aproximadamente, una de cada diez personas a quien le da difteria, muere. Afortunadamente, sólo pocos casos de difteria se han reportado en los Estados Unidos durante los últimos años. Esta disminución es debido en gran parte a las inmunizaciones.
- **La tos ferina**, también conocida como Tos Convulsiva, puede ser leve o seria y es fácilmente contagiada de una persona a otra. La tos ferina puede causar ataques de tos y ahogo lo que hace comer, beber o respirar muy difícil. La tos puede durar por varias semanas. La tos ferina es más peligrosa para bebés menores de un año de edad. Casi la mitad de todos los bebés con tos ferina están tan enfermos que se deben hospitalizar. Aproximadamente, uno de cada 100 casos muere de la enfermedad o queda con daño cerebral permanente.
- **El tétano**, también conocido como trismo, puede ocurrir después de una cortada o herida que se infectó. El tétano incapacita a una persona para abrir la boca o tragar, y causa espasmos serios de los músculos. Tres de cada diez personas a quienes les da ésta enfermedad mueren, y los que sobreviven tienen que ser hospitalizados por mucho tiempo.

¿Cuándo se da la vacuna?

La vacuna de DPT se da en cinco dosis: a los dos, cuatro, seis, y 18 meses y a los cuatro años de edad. Después de la quinta dosis, una inyección de refuerzo (booster) de tétano debe ser dada cada diez años.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?

En la mayoría de niños no hay efectos secundarios. Usted se dará cuenta que su bebé llora un poco más que de costumbre. Y a algunos niños se les pone rojo o hinchado donde se les aplicó la inyección, y tendrán calentura. Un calmante para el dolor es efectivo para tratar cualquier incomodidad que su bebé pueda tener con la vacuna. Consulte con su doctor o enfermera especialista acerca de la dosis correcta para su bebé.

Lláme a su doctor o enfermera especialista inmediatamente si:

- Su niño tiene calentura de más de 101.5 grados.
- Se da cuenta de cualquier hinchazón o enrojecimiento en el sitio de la inyección que dure más de dos días. Nota que su bebé llora incontrolablemente o cualquier otros síntomas raros que le preocupen.