

### Vacuna Contra la Polio

El mantener saludable a su nuevo bebé incluye asegurarse que las vacunas que están disponibles se le den a tiempo. Si su bebé no es vacunado, estará en riesgo de enfermarse de polio. Cuando vaya a sus chequeos regulares lleve su registro de vacunas para que la enfermera especialista o el doctor pueda anotar estas vacunas.

#### ¿Qué enfermedad puede prevenir ésta inmunización?

La polio es muy seria. Es una enfermedad que amenaza la vida y es causada por un virus. Puede causar parálisis y muerte. Los casos serios de polio, causan severo dolor de los músculos y a veces es difícil respirar sin la ayuda de una máquina. Los casos leves de polio pueden durar sólo unos días y causan fiebre, garganta dolorosa, dolor de estómago y dolor de cabeza. Consiguiendo esta vacuna protegerá a su bebé contra esta enfermedad.

#### ¿Cuándo se da la vacuna?

La vacuna de la polio se da en cuatro dosis, a los dos, cuatro, y seis meses, y a los cuatro años de edad. A veces la vacuna se puede dar tomada en forma de gotas de color rosa. Sin embargo, si su infante tiene un problema con su sistema inmunológico débil, o hay alguien que vive con su niño que tiene problemas con su sistema inmunológico, le pueden recomendar que a su bebé le den la vacuna de la polio por inyección.

#### ¿Hay algunos efectos secundarios?

La mayoría de los niños no presentan efectos secundarios. Muy raramente, esta vacuna puede causar polio leve en un niño que toma las gotas de color rosa y que tiene un sistema inmunológico débil. Usualmente si cualquier problema ocurre, será después de la primera dosis.

#### Llame a su doctor o enfermera especialista inmediatamente si:

- Su niño experimenta fiebre de más de 101.5.
- Se da cuenta de cualquier problema en los movimientos de los brazos o piernas.
- Se da cuenta de cualquier otros síntomas raros que le preocupen.

La primera vez que mi bebé recibió la vacuna de la polio, mi bebé \_\_\_\_\_.