

# **CONDUCTO LAGRIMAL**

---

## **¿Cómo Puedo Cuidar a Mi Bebé Cuando Tiene Bloqueado el Conducto Lagrimal?**

### **¿Qué es un bloqueo del conducto lagrimal?**

El ángulo interior del ojo contiene un saco pequeño donde se colecta el fluido que producen las lágrimas. A veces la abertura de este saco se tapa en la parte superior con células y moco. Cuando esto pasa, el tapón necesita ser masajeado suavemente por fuera. A veces el ojo se puede infectar. Si ve señales de una infección, llame al doctor o vea a la enfermera especialista de su niño(a) en cuanto le sea posible.

### **¿Cómo puedo saber si mi bebé tiene bloqueado el conducto lagrimal?**

Un bloqueo del conducto de las lágrimas usualmente ocurre en el período en que el recién nacido no tiene aún dos meses. Puede ocurrir en un ojo o en ambos ojos. Si su bebé tiene un bloqueo del conducto lagrimal, su ojo no estará probablemente ni rojo ni hinchado, pero se dará cuenta por agua que le saldrá de uno o de ambos ojos, aún cuando no esté enojado o llorando. Cuando su bebé llora, se dará cuenta de que el orificio nasal del lado del bloqueo de conducto se queda seco.

### **Qué debo hacer?**

Es posible que su pediatra recomienda que aplique una compresa tibia en el lado afectado. Empiece por lavar sus manos con jabón y agua tibia.

### **¿Cuándo debo preocuparme por el ojo de mi bebé? Debe llamar a su doctor o a la enfermera especialista en seguida, si se da cuenta de:**

- Cualquier enrojecimiento o hinchazón que aparece alrededor del ojo
- Un área roja a la esquina interior del ojo
- Los párpados de su bebé se pegan con pus después de dormir
- Mucha secreción amarilla o verde que sale del ojo de su bebé
- Ver señales del bloqueo del conducto lagrimal nuevo cuando su bebé es mayor de tres meses
- Que tiene preguntas acerca de como cuidar los ojos de su bebé